


Je me vaccine et je partage

Si vous êtes enceinte
ou que vous allaitez,
participez à la
surveillance
des effets secondaires des
vaccins contre la
COVID-19 en vous
inscrivant sur le site web
jusqu'à 48h après avoir
reçu la première dose de
vaccin (ou le booster).



www.covidvaccinemonitor.eu/ch



COVI-PREG

International COVID-19 and Pregnancy Registry

Vous êtes enceinte ou vous allaitez et avez reçu le vaccin anti-Covid-19

Vous pouvez signaler tout effet secondaire, c'est important!

Cette étude a été financée par l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui est responsable de l'approbation et du suivi post-marketing des médicaments. L'université de Berne, en collaboration avec d'autres partenaires suisses (COVI-PREG) et internationaux (16 pays européens), recueille des informations sur les effets secondaires possibles de la vaccination anti-COVID-19. Vous aussi, vous pouvez participer.

La participation est simple

Vous êtes enceinte ou vous allaitez et vous avez reçu le vaccin COVID-19 il y a moins de 48 heures? Participez à l'étude en vous inscrivant sur le site web :
www.covidvaccinemonitor.eu/ch

Sur le site web, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour participer. Après votre inscription, vous recevrez un e-mail contenant des instructions sur la manière de remplir le questionnaire de référence. Ensuite, au cours des six mois suivants, vous recevrez d'autres questionnaires de suivi. Enfin, vous recevrez un questionnaire à la fin de votre grossesse, environ 45 jours après la date prévue de l'accouchement, ou un questionnaire spécifique à l'allaitement.

Rendre les vaccins encore plus sûrs

Les vaccins contre la COVID-19 ont fait l'objet d'études approfondies et répondent à toutes les exigences de sécurité de tout autre vaccin. Initialement, en raison de la situation d'urgence, les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans les essais cliniques et il est très important de surveiller attentivement leur réponse à la vaccination. Les données actuelles montrent que les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces et sûrs pendant la grossesse et l'allaitement. Ils sont particulièrement recommandés car le risque de développer une forme sévère de COVID-19 est plus élevé pendant la grossesse.

En participant à cette étude, vous pouvez nous aider à recueillir des informations importantes en Suisse pour rendre l'utilisation des vaccins pendant la grossesse encore plus sûre. Toutes les informations recueillies seront partagées avec l'EMA et les systèmes de pharmacovigilance et comparées à celles d'autres pays.

Ce que nous voulons savoir

Dans les questionnaires, vous trouverez des questions sur votre santé, votre grossesse et les éventuels effets secondaires que vous pourriez vouloir nous signaler après la vaccination. Remplir chaque questionnaire ne prendra pas plus de 10 minutes ; n'oubliez pas que vous pouvez participer **jusqu'à 48 heures après la première dose de vaccin (ou le booster)**.

Si vous changez d'avis, pas de problème : vous pouvez décider de vous retirer et de cesser de participer à l'étude à tout moment, sans avoir besoin de vous justifier et sans aucune conséquence.

Pour participer à l'étude, allez sur



www.covidvaccinemonitor.eu/ch

**Et contribuez avec nous à la sécurité des vaccins contre
la COVID-19 pendant la grossesse et l'allaitement!**

Cette étude est coordonnée par l'Université de Berne. Vos données personnelles seront traitées de manière confidentielle.

AVEC LA PARTICIPATION DE

